



COLECÇÃO DE FIGUEIRAS DO ALGARVE
CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE VARIEDADES

João Costa
Armindo Rosa

DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALGARVE

COLECÇÃO DE FIGUEIRAS DO ALGARVE CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE VARIEDADES

João Costa
Armindo Rosa

DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALGARVE

FARO 2020



ÍNDICE

I – Introdução	5
II – Origem, Classificação Botânica e Principais Características	
Morfológicas	6
III – Material e Métodos - Instalação da Colecção do CEAT	7
IV – Caracterização Morfológica	8
V – Fichas de caracterização das distintas variedades	9
FIGUEIRAS:	
Cachopeira	10
Princesa	11
Bacela	12
Santanária	13
Pintassilga	14
Dois à folha	15
Lampa Branca	16
Da Ponte	17
Maria das Virgens	18
Moscatel	19
Sete Camadas	20
Da Ponte de Quarteira	21
Bebera Preta	22
Bacalar	23
Porta da Laginha	24
Burjassote Branco	25
Coelha	26
Olho Cego	27
Rainha	28
Leiteira	29
Côtea	30
Moscatel de Odiáxere	31
Premagem	32
Urjal	33
Bacorinha	34
Verdeal	35
Bebera Branca	36
Da Mina	37
Cavaleira	38
Fandanguinho	39
Couro Duro	40
Zara	41
Burjassote Preto	42
Cu de Burro	43
Materneta	44
São Luís	45
Miguel do Vale	46
Passarinha	47

Três Num Prato 1	48	Parda	72
Três Num Prato 2	49	Rosa	73
Sofenho	50	Col de Dama	74
Pedral	51	Dauphine	75
Pingo de Mel	52	CN250	76
Lampa Preta	53	CN 40	77
São João	54	Orelha de Mula	78
Pardinha 2	55	Colhão do Mundo	79
Do Maia	56	Sacristão da Luz	80
Toque Branco	57	Pinta	81
Toque Preto	58	Bilharda	82
Da Guia	59	Do Gravito	83
Leva Toca	60	Dos Calvos	84
Euchária Branca	61	Formosa	85
Castelhana Branca	62	Inverniça	86
Cara Lisa	63	Castelo de Qnedo	87
Belmandil	64	Longela	88
Castelhana Preta	65	Sopa e Vinho	89
Euchária Preta	66	Regalo	90
Castelhana da Rocha	67	Figo Duro	91
Ramelicha	68	Bispa	92
Turca	69	Passanuda	93
Caromb	70	Comadre Rosa	94
Lampa Parda	71		

I – INTRODUÇÃO

Espécie rústica, de climas quentes e temperados, pouco exigente em solos, encontra no Algarve condições edafo-climáticas extremamente favoráveis ao seu desenvolvimento. Componente do histórico pomar de sequeiro, outrora com grande peso e importância sócio-económica na região, principalmente na vertente de figo para secar, tem vindo a perder importância com abandono generalizado, se bem que nos últimos anos, devido aos bons preços praticados se tenha verificado um novo interesse pela cultura nomeadamente na variante de figo para consumo em fresco.

A tradição da cultura ao longo dos anos levou à existência de uma grande diversidade de variedades ou de denominações varietais adaptadas à produção de figo fresco, de figo para secar, ou mesmo com dupla aptidão. Desde 1994 que existe no Centro de Experimentação Agrária de Tavira (CEAT) uma colecção de elevado valor cultural e genético englobando cerca de 57 variedades transferidas de uma antiga colecção existente no Morgado da Lameira em Alcantarilha. O projecto FRUTALG (Prospecção, Recolha Conservação e Caracterização de Variedades Tradicionais de Fruteiras Algarvias com Interesse para a Agricultura Portuguesa) que decorreu entre 2011 e 2014 tornou possível o enriquecimento dessa colecção, a qual totaliza no momento cerca de 97 variedades devidamente cuidadas e preservadas. Pouca informação escrita existe sobre todo este património.

Caracterizar e conhecer melhor as variedades de figueiras algarvias, é trabalho que integrado nos nossos objectivos, temos vindo a desenvolver nestes últimos três anos. Esperemos que o mesmo possa contribuir não só na ajuda à tomada de decisão por parte dos nossos agricultores na escolha das variedades mais interessantes para a produção, como também para o desenvolvimento quer da fruticultura algarvia, quer da fruticultura portuguesa.

II - ORIGEM, CLASSIFICAÇÃO BOTÂNICA E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

A figueira pertence à família *Moraceae*, género *Ficus*, espécie *figus carica* L. Originária do Próximo Oriente, encontra na região mediterrânica condições adequadas ao seu bom desenvolvimento. Distribuí-se na actualidade por todas as regiões temperadas, tropicais e subtropicais do globo. Adapta-se a uma grande gama de solos desde os profundos, ricos e permeáveis onde se desenvolve melhor, aos pedregosos, pobres e áridos onde adquire menor desenvolvimento. A produção mundial encontra-se concentrada principalmente no Médio Oriente, E. Unidos e Brasil.

Trata-se de uma espécie com grande diversidade de variedades, denominações varietais ou sinónimas. Existem dois grandes grupos de figueiras, a *Ficus carica var. sylvestris* (figueira brava, baforeira ou de toque) apenas com a função de polinização, produzindo três camadas de figos não comestíveis (boloitos, lampos e vindimos) e a *Ficus carica var. sativa* ou figueira mansa a qual pode produzir uma ou duas camadas de figos, vindimos ou lampos e vindimos ambos comestíveis. Consoante a biologia floral, necessidade ou não de caprificação (polinização) e capacidade para produzir uma ou duas camadas de figos as variedades de figueiras produtoras de figos comestíveis podem agrupar-se nos quatro grupos seguintes:

- Variedades de figueiras do grupo Cachopo – Variedades com capacidade para produzir duas camadas de figos, lampos e vindimos, sem necessidade de caprificação;
- Variedades de figueiras do grupo São Pedro – Variedades com capacidade para produzir duas camadas de figos, lampos e vindimos, em que apenas os vindimos necessitam caprificação;
- Variedades de figueiras do grupo Comum – Variedades com capacidade para produzir apenas uma camada de figos, sem necessidade de caprificação;
- Variedades de figueiras do grupo Esmirna – Variedades com capacidade para produzir apenas uma camada de figos, exigindo caprificação.

As flores são pequenas, unissexuadas dispostas em inflorescência denominadas sicónios. O fruto é uma infrutescência ou conjunto de pequenos frutos denomi-

nados aquênios. Forma-se nos gomos axilares dos ramos do ano amadurecendo durante o verão (figos vindimos) ou nos gomos da extremidade dos ramos do ano anterior, passando o Inverno no estado de dormência, com maturação no final da Primavera, início do Verão (figos lampos).

III – MATERIAL E MÉTODOS - INSTALAÇÃO DA COLECÇÃO DO CEAT

- Prospeccção e georreferênciação por toda a região, de Barlavento a Sotavento, no litoral , barrocal e serra, de variedades ou denominações varietais de figueiras algarvias;
- Colheita de estacas de madeira dura durante o período de repouso;
- Enraizamento em estufa no Centro de Experimentação Hortofruticola do Patacão em sacos de plástico negro cheios de substrato à base de turfa e perlite tendo em vista a obtenção de plantas para instalação da colecção;
- Preparação do terreno para a plantação (ripagem, lavoura, gradagem);
- Análises de solo e realização da fertilização de fundo em função dos resultados das análises;
- Instalação do sistema de rega gota a gota;
- Plantação no CEAT de Tavira das planta previamente enraizadas com cerca de 1 ano de idade, segundo o compasso de 6 m na entre linha por 4 m na linha;
- Colocação de tutores após a plantação para sujeição das plantas;
- Formação e condução em vaso;
- Realização de todos os trabalhos e amanhos culturais nomeadamente podas, limpeza de rebentos, controle de infestantes, rega, fertilização de cobertura e tratamentos adequados.

IV – CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA

Dado o grande número de variedades que compõem a colecção e a falta de meios técnicos disponíveis, a caracterização foi feita tendo como base descritores simplificados da UPOV com incidência nos parâmetros seguintes:

- Planta – Porte, Vigor, Densidade de Folhagem;
- Folha – Tamanho, cor, nº de lóbulos;
- Fruto – Tamanho, Forma, Cor, Dimensão do Ostíolo, Fendilhamento da Pele, Tamanho e Forma do Pedúnculo, Facilidade de Colheita, Cor da Polpa, Cavidade Interna, Sabor, Consistência, Resistência ao Transporte e Manuseamento;

Precocidade, Maturação e Época de Colheita.

V – FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO DAS DISTINTAS VARIEDADES

FIGUEIRAS

**Observações das características das plantas e frutos
(2016/2018)**



Cachopeira

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5		3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7		7
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7		7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7		7
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3		2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5		3/5
	Aptidão – Lampos 1 Vindimos 2 Lampos e Vindimos 3		3
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3		3
	(L) – Figos Lampos; (V) – Figos Vindimos		(L) (V)
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7		5 7
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7		7 3
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Purpúrea 7		3 3
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7		5 5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3		1 3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7		3/5 5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7		5 5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7		5 5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7		5 5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7		7 7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7		5 5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7		3 3

Apreciação geral: Variedade produtiva, precoce, com interesse para produção de vindimos para consumo em fresco. Fruto médio, de cor verde amarelada com tendência a rachar junto ao ostíolo, polpa doce, rosa acastanhada, de difícil secagem, com pouca resistência ao manuseamento e transporte.



Princesa

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3/5
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	3
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	(L) – Figos Lamos; (V) – Figos Vindimos	(L) (V)
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5 7
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	7 3
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Purpúrea 7	3 3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5 5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	1 3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3/5 5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5 5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5 5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	5 5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7 7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5 5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	3 3

Apreciação geral: Variedade produtiva, precoce, com interesse para produção de vindimos para consumo em fresco com características similares a Cachopeira.



Bacela

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3/5
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	3
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	(L) – Figos Lamos; (V) – Figos Vindimos	(L) (V)
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5 5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	7 3
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Purpúrea 7	3 3
	Ostiolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5 5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	1 3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3/5 5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5 5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5 5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	5 5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7 7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5 5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	3 3

Apreciação geral: Variedade produtiva, precoce, adaptada à produção de vindimos para consumo em fresco com características similares a Cachopeira e Princesa.



Santanária

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentálobada 5	3/5
	Aptidão – Lampos 1 Vindimos 2 Lampos e Vindimos 3	3
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	(L) – Figs Lampos; (V) – Figs Vindimos	(L) (V)
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5 7
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	7 3
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Purpúrea 7	3 3
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5 5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	1 3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3/5 5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5 5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5 5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	5 5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7 7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5 5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	3 3

Apreciação geral: Variedade produtiva, precoce, com boa aptidão para produção de vindimos para consumo em fresco com características similares a Cachopeira, Princesa e Bacela.



Pintassilga

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	3
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3
	Aptidão – Lamosos 1 Vindimos 2 Lamosos e Vindimos 3	3
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	(L) – Figos Lamosos; (V) – Figos Vindimos	(L) (V)
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5 5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	7 7
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Purpúrea 7	3 3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3 3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	1 3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5 5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3 3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7 7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	5 5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7 7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7 5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7 7

Apreciação geral: Variedade de produtividade média, semi precoce, com pouco interesse cultural. Fruto de tamanho médio, verde escuro, polpa vermelho escura, bom sabor e boa resistência ao manuseamento e transporte.



Dois à folha

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3	
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5	
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5	
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7	
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2	
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3	
	Aptidão – Lampos 1 Vindimos 2 Lampos e Vindimos 3	3	
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3	
	(L) – Figos Lampos; (V) – Figos Vindimos	(L)	(V)
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3/5	3/5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Purpúrea 7	3	3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3	3/5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	1	1
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5	7

Apreciação geral: Variedade produtiva, semi precoce, com algum interesse na produção de vindimos para consumo em fresco. Fruto pequeno a médio, verde, polpa vermelha, doce, com razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Lampa Branca

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5/7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3
	Aptidão – Lampos 1 Vindimos 2 Lampos e Vindimos 3	3
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	(L) – Figos Lampos; (V) – Figos Vindimos	(L) (V)
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7 5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	7 3/5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Purpúrea 7	3 3
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5 5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2 3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3 5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5 3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	3 3
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	5 5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7 7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5 5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	3 5

Apreciação geral: Variedade produtiva, precoce, boa produtora de lampos e vindimos para consumo em fresco. Fruto médio a grande, verde amarelada, polpa rosa acastanhada, bom sabor, com fraca a média resistência ao manuseamento e transporte.



Da Ponte

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3	
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5	
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5	
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7	
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	1	
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	1/3	
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	3	
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3	
	(L) – Figos Lamos; (V) – Figos Vindimos	(L) (V)	
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5	3/5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Purpúrea 7	3	3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5	5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	1	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5	5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7	5

Apreciação geral: Parece- nos tratar-se da variedade Da Ponte de Quarteira.



Maria das Virgens

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3
	Aptidão – Lamosos 1 Vindimos 2 Lamosos e Vindimos 3	3
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	(L) – Figos Lamosos; (V) – Figos Vindimos	(L) (V)
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	7
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Purpúrea 7	7
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7

Apreciação geral: Variedade de produção média, semi precoce, com algum interesse na produção de vindimos para fresco. Figo médio a grande, violáceo, polpa rosa acastanhada, com boa resistência ao manuseamento e transporte.



Moscatel

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3	
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5	
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5	
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7	
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2	
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3/1	
	Aptidão – Lampos 1 Vindimos 2 Lampos e Vindimos 3	3	
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3	
	(L) – Figs Lampos; (V) – Figs Vindimos	(L)	(V)
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3	3
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Purpúrea 7	3	3
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5	5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	1	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3	7
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5	5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	5	7
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5/7	3

Apreciação geral: Variedade produtiva, semi precoce, boa produtora de vindimos para fresco. Figo médio, verde amarelada, polpa rosa acastanhada, doce, com fraca resistência ao manuseamento e transporte.



Sete Camadas

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3
	Aptidão – Lamosos 1 Vindimos 2 Lamosos e Vindimos 3	3
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	(L) – Figos Lamosos; (V) – Figos Vindimos	(L) (V)
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Purpúrea 7	3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3/5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7

Apreciação geral: Variedade produtiva, semi precoce, com algum interesse na produção de vindimos para fresco. Figo médio, verde amarelada, polpa vermelho escuro, doce, com boa resistência ao manuseamento e transporte.



Da Ponte de Quarteira

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	1
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentálobada 5	1/3
	Aptidão – Lampos 1 Vindimos 2 Lampos e Vindimos 3	3
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	(L) – Figs Lampos; (V) – Figs Vindimos	(L) (V)
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3 3/5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5 5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Purpúrea 7	3 3
	Ostiolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5 5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	1 3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5 5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3 5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5 7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3 3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5 7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7 7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7 5

Apreciação geral: Variedade produtiva, precoce, com interesse na produção de vindimos para fresco. Figo pequeno a médio, de epiderme verde amarelada, polpa vermelho escura, doce, com boa resistência ao manuseamento e transporte.



Bebera Preta

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3/5
	Aptidão – Lampos 1 Vindimos 2 Lampos e Vindimos 3	3
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	(L) – Figos Lampos; (V) – Figos Vindimos	(L) (V)
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5 3/5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	7 5/7
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Purpúrea 7	7 7
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5 3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2 2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3 5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	7 7
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	3 5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	5 5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7 5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7 7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7 7

Apreciação geral: Variedade de média produtividade, com algum interesse na produção de vindimos para fresco. Figo pequeno a médio, violáceo, polpa rosa acastanhada, médio sabor, boa resistência ao manuseamento e transporte.



Bacalar

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3	
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7	
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5	
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7	
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	3	
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3/5	
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	3	
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3	
	(L) – Figos Lamos; (V) – Figos Vindimos	(L) (V)	
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7 7	
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5 5	
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Purpúrea 7	5/7 7	
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5 3	
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	1 2	
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5 3	
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3 7	
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5 5/7	
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	5 5	
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7 7	
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5 5	
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5 5	

Apreciação geral: Variedade de produção média, semi precoce, com pouco interesse cultural. Figo médio a grande, violáceo, polpa rosa acastanhada a vermelho escuro, doce, com boa resistência ao manuseamento e transporte.



Porta da Laginha

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3/5
	Aptidão – Lampos 1 Vindimos 2 Lampos e Vindimos 3	3
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	(L) – Figos Lampos; (V) – Figos Vindimos	(L) (V)
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5 5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5 5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Purpúrea 7	5 5
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3 3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	1 3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3/5 3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3 3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	3 3
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3 3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7 7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7 7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5 5

Apreciação geral: Variedade de média produtividade, semi-precoce, com pouco interesse cultural. Fruto médio, verde com laivos violáceos, polpa âmbar, doce, com razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Burjassote Branco

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	3/1
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3/5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7

Apreciação geral: Variedade muito produtiva, semi precoce, com interesse na produção de figo fresco e para secar. Fruto pequeno, verde amarelado, polpa rosa acastanhada a vermelha, doce, com boa resistência ao manuseamento e transporte.



Coelha

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3/5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	1
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	7
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5/7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7

Apreciação geral: Variedade produtiva, tardia, com pouco interesse cultural. Fruto pequeno, verde amarelado, polpa rosa acastanhada a vermelha, doce, com boa resistência ao manuseamento e transporte.



Olho Cego

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	3/1
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3/5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	7
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5/7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade produtiva, tardia, com pouco interesse cultural. Fruto pequeno, verde amarelado, polpa rosa acastanhada a vermelha, doce, com razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Rainha

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3/5
	Aptidão – Lamosos 1 Vindimos 2 Lamosos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3/5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	7
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	3/5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7

Apreciação geral: Variedade de média produção, precoce, com pouco interesse cultural. Figo pequeno, verde amarelado, polpa âmbar a rosa acastanhada, doce, com boa resistência ao manuseamento e transporte.



Leiteira

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	3
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3/5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3/5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5/7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7

Apreciação geral: Variedade de média produção, tardia, com pouco interesse cultural. Figo pequeno, verde amarelado, polpa rosa acastanhada a vermelha, sabor médio, com boa resistência ao manuseamento e transporte.



Côtea

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5/7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3
	Aptidão – Lamosos 1 Vindimos 2 Lamosos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	7
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade produtiva, semi precoce, muito interessante na produção de vindimos para secar. Figo pequeno a médio, verde amarelado, polpa rosa acastanhada, bom sabor, média resistência ao manuseamento e transporte.



Moscatel de Odiáxere

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	1/3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	5/3
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5/7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade pouco produtiva, precoce, produtora de vindimos quer para fresco quer para secar. Figo médio, verde amarelado, polpa rosa acastanhada a vermelho escuro, bom sabor, boa resistência ao manuseamento e transporte.



Premagem

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	3
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3/5
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5/7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7

Apreciação geral: Variedade produtiva, precoce, com algum interesse na produção de vindimos para secar. Figo médio, verde amarelado, polpa rosa acastanhada a vermelho escuro, bom sabor, boa resistência ao manuseamento e transporte.



Urjal

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	3
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	3/5
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3/5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	1
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	7
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3/5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade de média produtividade, semi precoce, com pouco interesse cultural. Figo pequeno, verde amarelado, polpa rosa acastanhada, sabor mediano, média resistência ao manuseamento e transporte.



Bacorinha

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	5
	Aptidão – Lamosos 1 Vindimos 2 Lamosos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5/7
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	1
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	7
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	3
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5/7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade de fraca produção, precoce, com pouco interesse cultural. Figo pequeno, verde amarelado, polpa rosa acastanhada, de fraco sabor e média resistência ao manuseamento e transporte.



Verdeal

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	1/3
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5/7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade de produtividade média, tardia, com interesse na produção de vindimos para fresco. Figo médio, verde escuro, polpa rosa acastanhada a vermelha, bom sabor e média resistência ao manuseamento e transporte.



Bebera Branca

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3/5
	Aptidão – Lamosos 1 Vindimos 2 Lamosos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	7
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	5
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade produtiva, tardia, com grande interesse na produção de vindimos para fresco. Figo muito grande, piriforme oblongo, verde com laivos violáceos, polpa rosa acastanhada, com razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Da Mina

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	3/5
	Aptidão – Lampos 1 Vindimos 2 Lampos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	5
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade de produção média, precoce, com relativo interesse para fresco. Figo médio, de forma globosa, verde com laivos violáceos, polpa rosa acastanhada, bom sabor e média resistência ao manuseamento e transporte.



Cavaleira

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3/5
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3/5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	5
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade de média produção, semi precoce, com muito pouco interesse comercial. Fruto pequeno, verde com laivos violáceos, polpa rosa acastanhada, doce, com razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Fandanguinho

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	1/3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	3
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentálobada 5	3/5
	Aptidão – Lampos 1 Vindimos 2 Lampos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	5
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	3
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade de produção média, precoce, com pouco interesse cultural. Figo pequeno, verde com laivos violáceos, polpa âmbar, doce, com razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Couro Duro

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	5
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5/7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7

Apreciação geral: Variedade de produção média, semi precoce, com pouco interesse cultural. Figo pequeno, verde com laivos violáceos, polpa rosa acastanhada a vermelho escuro, doce, com boa resistência ao manuseamento e transporte.



Zara

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	3
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7

Apreciação geral: Variedade de média produção, precoce, com pouco interesse cultural. Figo pequeno, verde amarelado, polpa rosa acastanhada, doce, com boa resistência ao manuseamento e transporte.



Burjassote Preto

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3/5
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3/1
	Aptidão – Lamosos 1 Vindimos 2 Lamosos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	7
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	7
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade de média produtividade, tardia, com pouco interesse cultural. Fruto pequeno a médio, violáceo, polpa vermelho escura a purpúrea, sabor mediano, razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Cu de Burro

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	3
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	7
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	7
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade de produtividade média, semi precoce, com pouco interesse cultural. Figo pequeno, violáceo, polpa vermelho escuro a purpúrea, sabor razoável, média resistência ao manuseamento e transporte.



Materneta

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	5
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	7
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	5/7
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade de produção média, precoce com pouco interesse cultural.

Figo pequeno a médio, violáceo, polpa rosa acastanhada, sabor médio, razoável resistência ao manuseamento e transporte.



São Luís

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentálobada 5	3/1
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	7
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	7
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	3
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7

Apreciação geral: Variedade de média produção, precoce, com pouco interesse cultural. Figo médio, violáceo, polpa âmbar, doce, com boa resistência ao manuseamento e transporte.



Miguel do Vale

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	5/3
	Aptidão – Lamosos 1 Vindimos 2 Lamosos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	5
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	7
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade de média produtividade, semi precoce com pouco interesse cultural. Fruto pequeno a médio, verde com laivos violáceos, polpa vermelho escura, médio sabor, razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Passarinha

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	3
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3/5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	7
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7

Apreciação geral: Variedade de produção média, semi precoce, com pouco interesse cultural. Figo pequeno, violáceo, polpa vermelho escuro a purpúrea, médio sabor, boa resistência ao manuseamento e transporte.



Três Num Prato 1

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	5/3
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7

Apreciação geral: Variedade de média produtividade, precoce, com pouco interesse cultural. Figo médio, verde, polpa vermelho escura, médio sabor, boa resistência ao manuseamento e transporte.



Três Num Prato 2

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	5
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	7
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	7
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5/7

Apreciação geral: Variedade com interesse cultural, com características similares a castelhana Preto.



Sofenho

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3/5
	Aptidão – Lamosos 1 Vindimos 2 Lamosos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	5
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	7
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3/5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7

Apreciação geral: Variedade de média produtividade, tardia, com pouco interesse cultural. Figo pequeno, verde com laivos violáceos, polpa rosa acastanhada, doce, com boa resistência ao manuseamento e transporte.



Pedral

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	3/5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	3/1
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	7
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	7
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5/7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade de produção média, semi precoce, com pouco interesse cultural. Figo pequeno, de cor violácea, polpa rosa acastanhada, doce, com razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Pingo de Mel

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	3/5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3/1
	Aptidão – Lamosos 1 Vindimos 2 Lamosos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	3
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7

Apreciação geral: Variedade produtiva, precoce, com interesse para produção de vindimos para consumo em fresco. Figo médio, verde amarelado, polpa âmbar, doce, com boa resistência ao manuseamento e transporte.



Lampa Preta

(Lamos)

(Vindimos)

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3/1
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	3
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	1
	(L) – Figos Lamos; (V) – Figos Vindimos	(L) (V)
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7 5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	7 5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Purpúrea 7	5 5/7
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5 5
Fruito	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2 3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5 3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3 7
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	3 5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	5 5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7 7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5 7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5 5

Apreciação geral: Variedade produtiva, precoce, com grande interesse na produção de lamos, menos interessante na produção de vindimos, os quais necessitam de caprificação. Lamos grandes, vindimos de tamanho médio, verdes com laivos violáceos, polpa âmbar nos lamos e rosa acastanhada nos vindimos, bom sabor, razoável resistência ao manuseamento e transporte.



São João

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3/1
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	1
	(L) – Figos Lamos; (V) – Figos Vindimos	(L) (V)
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7 5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	7 5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Purpúrea 7	5 5
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5 3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3 3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3 3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3 7
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	3 5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	5 5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7 7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7 7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5 3

Apreciação geral: Variedade de média produtividade, precoce, com pouco interesse cultural. Lamos médios a grandes, vindimos pequenos a médios, verdes com laivos violáceos, polpa âmbar nos lamos e rosa acastanhada nos vindimos, bom sabor, média resistência ao manuseamento e transporte.



Pardinha 2

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	3
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentálobada 5	3/5
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3/5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	5
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5/7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade de média produção, semi precoce, com pouco interesse cultural. Fruto médio, verde com laivos violáceos, polpa rosa acastanhada a vermelho escura, bom sabor, média resistência ao manuseamento e transporte.



Do Maia

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	5/3
	Aptidão – Lampos 1 Vindimos 2 Lampos e Vindimos 3	3
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	1
	(L) – Figs Lampos; (V) – Figs Vindimos	(L) (V)
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5 5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3/5 3/5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Purpúrea 7	3 3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5 5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	1 2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5 3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3 7
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5 5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3 5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	3 5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7 5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7 5

Apreciação geral: Variedade de produção média, precoce, com pouco interesse cultural na produção de lampos e vindimos, estes necessitando de caprificação. Fruto médio, verde amarelado, polpa rosa acastanhada, sabor mediano, razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Toque Branco

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	-
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	-
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3/5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	1
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	3
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	-
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	-
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	-
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	-

Apreciação geral: Variedade de produção média com razoável quantidade de insectos polinizadores, utilizada para caprificação.



Toque Preto

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3/5
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	-
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	-
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3/5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	5/7
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	1
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5/7
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	3
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	-
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	-
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	-
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	-

Apreciação geral: Variedade de média produtividade com bastante quantidade de insectos polinizadores, utilizada para caprificação.



Da Guia

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	3
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	3/5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	3
	Aptidão – Lampos 1 Vindimos 2 Lampos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3/5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	5
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7

Apreciação geral: Variedade de fraca produtividade, precoce, sem interesse cultural.

Fruto pequeno, verde com laivos violáceos, polpa rosa acastanhada, doce, com boa resistência ao manuseamento e transporte.



Leva Toca

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7

Apreciação geral: Árvores jovens sem possibilidade de caracterização. Aparenta ser a variedade Castelhana Preta.



Euchária Branca

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	3
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	7
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5/7

Apreciação geral: Variedade de média produtividade, precoce, com interesse quer para consumo em fresco quer para passa. Figo grande, verde amarelado, polpa escura, violácea, doce, com razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Castelhana Branca

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5/7
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	5/3
	Aptidão – Lamosos 1 Vindimos 2 Lamosos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	5
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	3/5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade produtiva, precoce, com interesse na produção de vindimos quer para fresco quer para passa. Fruto pequeno a médio, verde com poucos laivos violáceos, polpa rosa acastanhada clara, doce, com razoável resistências ao manuseamento e transporte.



Cara Lisa

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentálobada 5	3
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	7
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5/7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3/5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7

Apreciação geral: Variedade produtiva, precoce, com algum interesse na produção de vindimos quer para consumo em fresco quer para passa. Fruto pequeno a médio, polpa rosa acastanhada a vermelho escura, doce, com boa resistência ao manuseamento e transporte.



Belmandil

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	5
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	5
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	7
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5/7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	3/5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade de produtividades média, precoce, com pouco interesse cultural. Fruto pequeno, verde com laivos violáceos, polpa rosa acastanhada a vermelho escura, pouco doce, com razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Castelhana Preta

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	3
	Aptidão – Lampos 1 Vindimos 2 Lampos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	7
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	7
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	3/5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade produtiva, precoce, com interesse na produção de vindimos quer para consumo em fresco quer para passa. Fruto médio, violáceo, polpa rosa acastanhada, doce, com razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Euchária Preta

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3/5
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3/5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	7
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade produtiva, precoce com algum interesse na produção de vindimos quer para consumo em fresco quer para passa. Fruto pequeno a médio, totalmente violáceo, polpa vermelho escura, doce, com razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Castelhana da Rocha

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	3
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	3/5
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	7
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	7
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Aparenta ser a variedade Castelhana Preta.



Ramelicha

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	5/3
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	5/7
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5/7
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5/7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade de média produtividade, semi precoce com pouco interesse cultural. Fruto médio, verde com laivos violáceos a quase violáceo, polpa rosa acastanhada a vermelho escura, sabor mediano, razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Turca

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	1
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	5
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3/5
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade de produção média, precoce, com pouco interesse cultural. Fruto médio a grande, verde com poucos laivos violáceos, polpa vermelho escura, razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Caromb

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	1
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3/5
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	1
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	5
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5/7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7

Apreciação geral: Variedade de produção mediana, precoce, com pouco interesse cultural. Fruto grande, verde com laivos violáceos, polpa rosa acastanhada a vermelho escuro, sabor razoável, boa resistência ao manuseamento e transporte.



Lampa Parda

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5
	Aptidão – Lampos 1 Vindimos 2 Lampos e Vindimos 3
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7

Apreciação geral: Árvores jovens sem possibilidade de caracterização.



Parda

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7
Apreciação geral: Árvores jovens sem possibilidade de caracterização.	



Rosa

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	1/3
	Aptidão – Lampos 1 Vindimos 2 Lampos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade de produção média, semi precoce, com algum interesse cultural. Fruto médio, verde amarelado, polpa rosa acastanhada, doce, com razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Col de Dama

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	5
	Aptidão – Lampos 1 Vindimos 2 Lampos e Vindimos 3	3
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	-
	(L) – Figos Lampos; (V) – Figos Vindimos	(L) (V)
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5/7
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Purpúrea 7	7
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7

Apreciação geral: Variedade de média produtividade, semi precoce, com pouco interesse cultural. Fruto pequeno a médio, violáceo, polpa vermelho escura arroxeada, bom sabor, boa resistência ao manuseamento e transporte.



Dauphine

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	3
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	3
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	-
	(L) – Figos Lamos; (V) – Figos Vindimos	(L) (V)
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Purpúrea 7	5
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	3
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7

Apreciação geral: Variedade de produção média, semi precoce com pouco interesse cultural. Fruto grande, verde com laivos violáceos, polpa Vermelho escuro, bom sabor, boa resistência ao manuseamento e transporte.



CN250

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	3
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	5
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	2
	Aptidão – Lampos 1 Vindimos 2 Lampos e Vindimos 3	3/5
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	-
	(L) – Figos Lampos; (V) – Figos Vindimos	(L) (V)
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Purpúrea 7	3
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	1
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	3
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	3
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade de média produtividade, precoce, com algum interesse cultural. Fruto médio, verde amarelado, polpa rosa acastanhada, sabor mediano, razoável resistência ao manuseamento e transporte.



CN 40

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	5
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3/5
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	3
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	-
	(L) – Figos Lamos; (V) – Figos Vindimos	(L) (V)
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Purpúrea 7	3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	1
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	3
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	3/5

Apreciação geral: Variedade de produção média, precoce, com algum interesse cultural. Fruto médio, verde amarelado, polpa âmbar, médio sabor, razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Orelha de Mula

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	3
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3/5
	Aptidão – Lamosos 1 Vindimos 2 Lamosos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	7
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade de produtividade média, tardia, com algum interesse cultural. Fruto pequeno a médio, violáceo, polpa rosa acastanhada, sabor médio, razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Colhão do Mundo

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	3
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	7
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	5
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Aparenta ser a variedade Bebera Branca.



Sacristão da Luz

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3/5
	Aptidão – Lamosos 1 Vindimos 2 Lamosos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	5
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade produtiva, precoce, com interesse cultural. Fruto médio a grande, verde com laivos violáceos, polpa vermelha, bom sabor, razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Pinta

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	3/5
	Aptidão – Lampos 1 Vindimos 2 Lampos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	1
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7

Apreciação geral: Variedade tardia com pouco interesse cultural. Fruto médio, verde amarelado, polpa vermelho escura, bom sabor, boa resistência ao manuseamento e transporte.



Bilharda

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	3
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	5
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	5/7
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	3
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	3
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade produtiva, precoce, com algum interesse cultural. Fruto médio, violáceo, polpa rosa acastanhada, médio sabor, razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Do Gravito

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	3
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	1
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade de média produtividade, semi precoce, com interesse cultural. Fruto médio verde amarelado, polpa vermelho escura, bom sabor, razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Dos Calvos

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
Folha	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
Fruto	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3
	Aptidão – Lamosos 1 Vindimos 2 Lamosos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5	
Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5	
Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5	

Apreciação geral: Variedade de produção média, semi precoce, com interesse cultural. Fruto médio, verde amarelado, vermelho escuro, sabor mediano, razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Formosa

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	5
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	3/5
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	5
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade produtiva, semi precoce a tardia, com interesse cultural. Fruto médio, verde com laivos violáceos, polpa vermelho escuro, sabor mediano, razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Inverniça

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	5/3
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	5
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	1
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	3
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade produtiva, tardia, sem interesse cultural. Fruto pequeno, verde com laivos violáceos, polpa vermelho escuro, médio sabor, razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Castelo de Qnedo

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	3/5
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	5
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	3
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5/7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	3
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	3

Apreciação geral: Variedade de média produção, precoce, com pouco interesse cultural. Fruto médio a grande, verde com laivos violáceo, polpa rosa acastanhada, sabor médio, pouca resistência ao manuseamento e transporte



Longela

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	5
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3
	Aptidão – Lamosos 1 Vindimos 2 Lamosos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3/5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	5
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3/5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade de produção média, semi precoce, sem interesse cultural. Fruto pequeno a médio, verde com laivos violáceos, polpa vermelho escuro, médio sabor, razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Sopa e Vinho

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5/7
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	5
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade de produtividade média, semi precoce, com interesse cultural. Fruto médio, verde com laivos violáceos, polpa vermelho escuro, médio sabor, razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Regalo

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	3
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3/5
	Aptidão – Lamosos 1 Vindimos 2 Lamosos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	1
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3/5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	3
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade precoce com pouco interesse cultural. Fruto médio, verde amarelado, polpa âmbar, médio sabor, razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Figo Duro

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	7
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	7
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	3
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	3
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	-
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3/5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	7
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5/7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7

Apreciação geral: Variedade de produção média, semi precoce, com pouco interesse cultural. Fruto pequeno a médio, violáceo, polpa rosa acastanhada a vermelho escuro, sabor médio, boa resistência ao manuseamento e transporte.



Bispa

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	5
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	3
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	3/5
	Aptidão – Lamosos 1 Vindimos 2 Lamosos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	-
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	7
	Ostíolo – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	5
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3/5
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	5

Apreciação geral: Variedade produtiva, precoce, com pouco interesse cultural. Fruto médio, violáceo, polpa rosa acastanhada, médio sabor, razoável resistência ao manuseamento e transporte.



Passanuda

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	7
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	3
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentilobada 5	5/3
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	3/5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	1
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	3
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	5
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	7
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7

Apreciação geral: Variedade de média produtividade, semi precoce, com interesse para passa. Fruto médio, verde amarelado, polpa vermelho escuro, médio sabor, boa resistência ao manuseamento e transporte.



Comadre Rosa

	Porte – Erecto 1 Aberto 3 Prostrado 5	3
Árvore	Vigor – Fraco 3 Médio 5 Forte 7	5
	Densidade de folhagem – Fraca 3 Média 5 Grande 7	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
Folha	Cor – Verde claro 1 Verde 2 Verde escuro 3	2
	Nº de lóbulos – Inteira 1 Trilobada 3 Pentalobada 5	5/3
	Aptidão – Lamos 1 Vindimos 2 Lamos e Vindimos 3	2
	Caprificação – Exigente 1 Não exigente 3	3
	Tamanho – Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	5
	Forma – Piriforme achatada 3 Globosa ovóide 5 Piriforme oblonga 7	5
	Cor – Verde amarelada 3 Verde com laivos violáceos 5 Totalmente violácea 7	3
	Ostíolo - Pequeno 3 Médio 5 Grande 7	3
Fruto	Fendilhamento – Ausente 1 Longitudinal 2 Irregular 3	2
	Pedúnculo – Curto 3 Médio 5 Longo 7	5
	Facilidade de colheita – Fácil 3 Média 5 Difícil 7	5
	Cor da polpa – Âmbar 3 Rosa acastanhada 5 Vermelho escuro 7	7
	Cavidade interna – Pequena 3 Média 5 Grande 7	3
	Sabor – Fraco 3 Médio 5 Bom 7	7
	Consistência da pele – Sensível 3 Média 5 Resistente 7	5
	Resistência ao manuseamento e transporte – Pouca 3 Média 5 Boa 7	7

Apreciação geral: Variedade de média produtividade, semi precoce, com algum interesse cultural. Fruto médio, verde amarelado, polpa vermelho escuro, bom sabor, boa resistência ao manuseamento e transporte.

João Manuel Guerreiro Costa (1952), natural de Querença, Loulé, Residente em Faro, licenciado em Ciências Agronómicas pelo Instituto Superior de Agronomia (1976).

Técnico da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve desde 4 de setembro de 1976 com desempenho em funções técnicas e de chefia nas áreas de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Participação ao longo de mais de 40 anos em ações e projetos de experimentação nas áreas da horticultura, floricultura, jardinagem, espaços verdes, fruticultura subtropical e mediterrânica, vinha e divulgação de resultados quer através de diversos órgãos de comunicação social, quer através de um enorme legado de informação escrita.

Armindo J. G. Rosa (1953), é natural de Castro Marim, residente em Faro, formado na Escola de Regentes Agrícolas de Évora (1978). No Ministério da Agricultura desde 1981, é Técnico Superior na Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve onde tem exercido funções técnicas e de coordenação com especial relevância nos na área da experimentação (fertilização e culturas hidropónicas):

1981/1987 – Técnico do projecto Luso Alemão de Hortofruticultura;

1987/2010 – Técnico com responsabilidades na área da experimentação (hortofruticultura, floricultura, rega, solarização de solos, controlo climático de estufas, hidroponia, compostagem);

1990/2003 – Gestor do Centro de Experimentação Hortofrutícola do Patacão;

1993/1997 – Chefe de Divisão de Desenvolvimento e Gestão da produção;

2009/2010 – Gestor de Núcleo no âmbito do Recenseamento Agrícola 2009 (RA09);

2010/ 2017 – Colaboração nos projectos Sulcastas 18.999 (vinha) e Frutal 18.642 (fruteiras regionais).

2017/2019 – Apoio técnico especializado e emissão de pareceres técnicos na área da Hortofruticola.

Fotografia: Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve

